S セメスター 全学体験ゼミナール「じっくり学ぶ数学 I」 レポート問題 (その 1)

問 1. $\mathbb{R}$ 上の関数 $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ と $x \in \mathbb{R}$ に対して,

$$f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h}$$

と定める. このとき, 以下の問に答えよ.

- (1) $f(x) = \cos x$ のとき, 三角関数の加法定理を用いて, $f(x+h) = \cos(x+h)$ を書き直すことで,

$$(\cos x)' = \cos x \cdot \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\cos h - 1}{h} - \sin x \cdot \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sin h}{h}$$

と表わせることを示せ.

- (2) $f(x) = \sin x$ のとき, 三角関数の加法定理を用いて, $f(x+h) = \sin(x+h)$ を書き直すことで,

$$(\sin x)' = \sin x \cdot \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\cos h - 1}{h} + \cos x \cdot \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sin h}{h}$$

と表わせることを示せ.

- (3) 図のように, 平面 $\mathbb{R}^2$ 上の点を,

$$O = (0, 0), A = (\cos h, \sin h), B = (\cos h, 0), C = (1, \tan h), D = (1, 0)$$

と定める. このとき,

$$(\triangle OAB \text{ の面積}) \leq (\text{扇形 } OAD \text{ の面積}) \leq (\triangle OCD \text{ の面積})$$

となることに注意して,

$$\frac{1}{2} \cos h \sin h \leq \frac{1}{2} h \leq \frac{1}{2} \tan h$$

となることを示せ.

(4) (3) の結果を用いて,

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sin h}{h}$$

を求めよ. また, この結果と,

$$\begin{aligned} \cos h - 1 &= \cos\left(2 \cdot \frac{h}{2}\right) - 1 \\ &= \cos^2 \frac{h}{2} - \sin^2 \frac{h}{2} - 1 \\ &= -2 \sin^2 \frac{h}{2} \end{aligned}$$

となることを用いて,

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{\cos h - 1}{h}$$

を求めよ.

(5) (1), (2), (4) の結果を合わせて,

$$\begin{cases} (\cos x)' = -\sin x, \\ (\sin x)' = \cos x \end{cases}$$

となることを示せ.

(6) $0 < a \in \mathbb{R}$ を正の実数として, 指数関数 $f(x) = a^x$ を考える. このとき, 指数法則を用いて,

$$f(x+h) = a^{x+h} = a^x \cdot a^h$$

と書き直して考えることにより,

$$C = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{a^h - 1}{h}$$

として,

$$(a^x)' = C a^x$$

となることを示せ.

(7) (6) で現われた定数 C は, $f(x) = a^x$ として,

$$C = f'(0)$$

と解釈できることを示せ.

♣ 特に, $C = 1$ となるような a の値を, すなわち, $f(x) = a^x$ の原点 $x = 0$ における接線の傾き $f'(0)$ が $f'(0) = 1$ となるような a の値を自然対数と呼び, e と表わす. このとき,

$$(e^x)' = e^x$$

というように微分の結果が最も簡明な形となる.

問 2.

- (1) 何度でも微分できる関数 $f(x)$ が,

$$f(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2 + \cdots + a_nx^n + \cdots \quad (1)$$

というように「(次数が無限大の)多項式の姿」に「化ける」としたら, どのような姿に「化ける」のがもっとももらしいか「当たり」をつけてみよ. すなわち, (1) 式の両辺を x に関して何度か微分してから, $x = 0$ とすることで, それぞれの係数 a_n がどのような値になるのがもっとももらしいのか「当たり」をつけてみよ.

- (2) (1) の結果を用いて, $f(x) = e^x, \cos x, \sin x$ が「(次数が無限大の)多項式の姿」に「化ける」としたら, どのような姿に「化ける」のがもっとももらしいか「当たり」をつけてみよ.

- (3) (2) で「当たり」を付けた $f(x) = e^x, \cos x, \sin x$ の「多項式の姿」について,

$$\begin{cases} (e^x)' = e^x \\ (\cos x)' = -\sin x \\ (\sin x)' = \cos x \end{cases}$$

という関係式が成り立っていることを確かめてみよ. ただし, 変数 x に関する微分を $(\cdot)'$ と表わした.

- (4) 「多項式の姿」を用いることで, 複素数 $z \in \mathbb{C}$ に対しても, e^z という値を,

$$e^z = 1 + z + \frac{z^2}{2!} + \frac{z^3}{3!} + \cdots + \frac{z^n}{n!} + \cdots \quad \in \mathbb{C}$$

という式によって定める. このとき, $z = \sqrt{-1}\theta$, ($\theta \in \mathbb{R}$) を純虚数として, $e^{\sqrt{-1}\theta}$ の実部と虚部がどうなるかを考えることにより,

$$e^{\sqrt{-1}\theta} = \cos \theta + \sqrt{-1} \sin \theta$$

となることを確かめてみよ.